



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Sapucaia do Sul, 28 de janeiro de 2022

**NOTA TÉCNICA E AGENDA – SEMANA 31 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO  
DE 2022**

**1. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE:**

**1.1 PFIZER:**

1.1.1 O intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) continua sendo de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer até o dia 18/dez.

**1.2 ASTRAZENECA/FIOCRUZ:**

1.2.1 Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, 7 semanas entre D1 e D2, imunizaremos com D2 quem fez a D1 até o dia 18/dez;

**1.3 CORONAVAC/Butantã:**

1.3.1 O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 17/jan.

**1.4 JANSSEN:**

1.4.1 Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

**2. RESUMO:**

2.1 **PFIZER:** Intervalo de 7 semanas da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3 = 08/out;

2.2 **ASTRAZENECA:** Intervalo de da D1 para D2 = intervalo de 7 semanas; de D2 para D3 = 4 meses = 08/out;

2.3 **JANSSEN:** Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3 = 08/out;

2.4 **CORONAVAC:** Intervalo de 14 a 28 dias da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3 = 08/out;

**3. TRABALHADORES DA SAÚDE**

3.1 Consideram-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose de reforço os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como por exemplo recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de serviços de interesse à saúde.

**4. Adolescentes:**

4.1 Adolescentes com idade a partir de 12 anos sem comorbidades. Com o imunizante da PFIZER ADULTO. Intervalo de 7 semanas entre D1 e D2. Esta população ainda não recebe 3ª dose.

**5. CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS- PFIZER PEDIATRICA**

5.1 Seguindo nota técnica do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, o município continua oferecendo agendamento para este público – somente com o imunizante da PFIZER PEDIÁTRICA. Nesta semana continuaremos imunizando crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou Deficiências e crianças com 9 anos completos sem comorbidades.

5.2 Será considerado a possibilidade de diminuir a idade durante a semana, dependendo da capacidade da agenda. Havendo esta diminuição, haverá comunicação nas redes sociais da Prefeitura de Sapucaia do Sul.

**6. CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS – CORONAVAC**

6.1 Este imunizante será oferecido para crianças/adolescentes de 6 a 17 anos – que não tenham diagnóstico de imunossupressão – cfe nota técnica 03/2022 1.

6.2 Nesta semana imunizaremos crianças com idade igual e superior a 9 anos e será considerado a possibilidade de diminuir a idade durante a semana, dependendo da capacidade da agenda. Havendo esta diminuição, haverá comunicação nas redes sociais da Prefeitura de Sapucaia do Sul.

**7. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES:**

7.1 Pessoas com alto grau de imunossupressão. Para estes, o intervalo para a segunda e terceira dose, contínua de 28 dias.

7.2 Somente este grupo, deve receber a quarta dose, com intervalo de 4 meses entre terceira e quarta dose, imunizante PFIZER. A vacina deve ser agendada pelo site: [www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaidosul](http://www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaidosul) e o usuário deve optar pelo imunizante da PFIZER.

**7.3 Critérios que definem o quadro de imunossupressão grave:**

7.3.1 Imunodeficiência primária grave.

7.3.2 Quimioterapia para câncer.

7.3.3 Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas

7.3.4 (TCTH)em uso de drogas imunossupressoras.

7.3.5 Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

<sup>1</sup> <https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202201/26204041-informe-tecnico-coronavac-criancas-adolescentes-26-01-2022.pdf>





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

- 7.3.6 Uso de corticoides em doses  $\geq 20$  mg/dia de prednisona, ou equivalente por  $\geq 14$  dias.
- 7.3.7 Pacientes em hemodiálise.
- 7.3.8 Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).
- 7.3.9 Uso de drogas modificadoras da resposta imune:
- 7.3.9.1 Metotrexato;
  - 7.3.9.2 Leflunomida
  - 7.3.9.3 Micofenolato de mofetila
  - 7.3.9.4 Azatiprina

**8. VIAGENS INTERNACIONAIS/ CIRURGIAS AGENDADAS**

8.1 Pessoas que tenham viagem internacional marcada, ou algum procedimento cirúrgico e que precisem antecipar calendário de imunização, devem procurar o setor de imunizações da Secretaria Mun. Da Saúde, Rua São Cristóvão, 34, munidos de documentos e comprovantes, para que seja realizado a imunização, conforme necessidade comprovada.

8.2 Os pacientes com cirurgia agendada, poderão ter a D2 antecipada, desde que o intervalo não seja inferior a 3 semanas, e a D3 não inferior a 4 meses. Salvo Pacientes imunossuprimidos que o intervalo é de 28 dias.

8.3 Viajantes que não completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina contracovid-19, poderão antecipar a segunda dose respeitando o intervalo mínimo de 21 dias para a vacina da Pfizer/Wyeth e 28 dias para a vacina AstraZeneca/Fiocruz (esquema homólogo);

8.4 Viajantes que completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina Sinovac/Butantan e terão como destino países cujos órgãos regulatórios não incluíram este imunizante até o momento na sua lista de vacinas autorizadas, poderão receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino (esquema heterólogo) seguindo o racional de intercambialidade de vacinas publicado na Nota Técnica nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Neste caso, o intervalo mínimo entre a série primária de vacinação e a terceira dose do outro imunizante será de 28 dias.

**9. TERCEIRA DOSE – OU DOSE DE REFORÇO.**

9.1 Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 2, e INFORME TÉCNICO nº 19/2021 DVE/CEVS/SES-

<sup>2</sup> <https://drive.google.com/file/d/1GZla607tiQByN0us7405rFeoBzyuA1Lk/view?usp=sharing>





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

RS3 e a NOTA TÉCNICA Nº 65/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 4; a nota técnica 19/2021 DVE/CEVS/SES-RS5 o município de Sapucaia do Sul, adota o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Reforçamos que este processo vacinal, tem características diferentes de outras campanhas. As diretrizes são dinâmicas e podem ser alteradas, sempre obedecendo o que determina o PNI, PNO e as normas do Governo Estadual.

**10. RESUMO:**

- **PFIZER**: Intervalo de 7 semanas da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;
- **ASTRAZENECA**: Intervalo de da D1 para D2 = intervalo de 7 semanas; de D2 para D3 = 4 meses;
- **JANSSEN**: Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;
- **CORONAVAC**: Intervalo de 14 a 28 dias da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3 –
- **CORONAVAC CRIANÇAS/ADOLESCENTES (6 a 17 anos)**: intervalo de 28 dias entre D1 e D2;
- **PFIZER PEDIÁTRICA (5 a 11 anos)**: 8 semanas de D1 para D2;

**11. INTERCAMBIALIDADE:**

11.1 Ficou definido que poderá haver intercambialidade entre os imunizantes administrados. Observando que **PREFERENCIALMENTE** a D2 seja do mesmo laboratório que o usuário recebeu a D1, mas que pode ser de laboratório diferente, levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante. A Terceira dose deve **PREFERENCIALMENTE** ser de laboratório diferente de D1 e D2.

**11.2 EXEMPLOS:**

11.2.1 Fiz D1 e D2 de CoronaVac, quanto tempo devo esperar para fazer a D3? E qual imunizante mais indicado. *Neste caso, após 4 meses as pessoas com mais de 18 anos podem receber uma dose de reforço, preferencial de ASTRA ou PFIZER.*

11.2.2 Fiz D1 e D2 de Pfizer, qual o intervalo para terceira dose e qual o imunizante mais indicado? *Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de reforço, preferencialmente CoronaVac ou AstraZeneca.*

<sup>3</sup> <https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=657104>

<sup>4</sup> <https://cdn.oantonista.com/uploads/2021/12/Nota-Tecnica-65-Antecipacao-da-Dose-de-Reforco.pdf>

<sup>5</sup> <https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202112/29170230-nota-tecnica-19-atualizacao-29-12.pdf>





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

11.2.3 Fiz D1 e D2 de AstraZeneca, qual o intervalo para terceira dose e qual o imunizante mais indicado? Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de reforço, preferencialmente CoronaVac ou AstraZeneca.

11.2.4 Posso fazer a D1 de um imunizante e a D2 de outro? Apesar de não haver proibição técnica, está indicado que a D1 e D2 sejam Preferencialmente, do mesmo imunizante.

**Comissão Municipal de imunização covid19**

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Enfª. Milena Weide<br>Coordenadora da Vigilância em Saúde | Enfº. Laércio Kerber<br>Assessor Superior            |
| Enfa. Flavia Motta<br>Coordenadora Planejamento Saúde     | Dra. Daniela Heuser<br>Secretária Municipal da Saúde |

