



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Sapucaia do Sul, 07 de janeiro de 2022

NOTA TÉCNICA E AGENDA – SEMANA 24 A 28 JANEIRO DE 2022

1. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE:

1.1 PFIZER:

1.1.1 O intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) continua sendo de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer até o dia 11/dez.

1.2 ASTRAZENECA/FIOCRUZ:

1.2.1 Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, 7 semanas entre D1 e D2, imunizaremos com D2 quem fez a D1 até o dia 11/dez;

1.3 CORONAVAC/Butantã:

1.3.1 O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 10/jan.

1.4 JANSSEN:

1.4.1 Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

2. RESUMO:

2.1 PFIZER: Intervalo de 7 semanas da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3 = 28/set;

2.2 ASTRAZENECA: Intervalo de da D1 para D2 = intervalo de 7 semanas; de D2 para D3 = 4 meses = 28/set;

2.3 JANSSEN: Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3 = 28/set;

2.4 CORONAVAC: Intervalo de 14 a 28 dias da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3 = 28/set;

3. TRABALHADORES DA SAÚDE

3.1 Consideram-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose de reforço os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como por exemplo recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de serviços de interesse à saúde.

4. Adolescentes:

4.1 Adolescentes com idade a partir de 12 anos sem comorbidades. Com o imunizante da PFIZER. Intervalo de 7 semanas entre D1 e D2. Esta população ainda não recebe 3ª dose.

5. CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

5.1 Seguindo nota técnica do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, o município continua oferecendo agendamento para este público – somente com o imunizante da PFIZER pediátrica. Nesta semana continuaremos imunizando crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou Deficiências e crianças com 11 anos completos sem comorbidades. Será considerado a possibilidade de diminuir a idade para 10 anos durante a semana, dependendo da capacidade da agenda. Havendo esta diminuição, haverá comunicação nas redes sociais da Prefeitura de Sapucaia do Sul.

6. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES:

6.1 Pessoas com alto grau de imunossupressão. Para estes, o intervalo para a segunda e terceira dose, continua com intervalo de 28 dias.

6.2 Somente este grupo, deve receber a quarta dose, com intervalo de 4 meses entre terceira e quarta dose, imunizante PFIZER. A vacina deve ser agendada pelo site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaidosul e o usuário deve optar pelo imunizante da PFIZER.

6.3 Crítérios que definem o quadro de imunossupressão grave:

6.3.1 Imunodeficiência primária grave.

6.3.2 Quimioterapia para câncer.

6.3.3 Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas

6.3.4 (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

6.3.5 Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

6.3.6 Uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por ≥ 14 dias.

6.3.7 Pacientes em hemodiálise.

6.3.8 Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

6.3.9 Uso de drogas modificadoras da resposta imune:

6.3.9.1 Metotrexato;

6.3.9.2 Leflunomida

6.3.9.3 Micofenolato de mofetila





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

6.3.9.4 Azatiprina

7. VIAGENS INTERNACIONAIS/ CIRURGIAS AGENDADAS

7.1 Pessoas que tenham viagem internacional marcada, ou algum procedimento cirúrgico e que precisem antecipar calendário de imunização, devem procurar o setor de imunizações da Secretaria Mun. Da Saúde, Rua São Cristóvão, 34, munidos de documentos e comprovantes, para que seja realizado a imunização, conforme necessidade comprovada.

7.2 Os pacientes com cirurgia agendada, poderão ter a D2 antecipada, desde que o intervalo não seja inferior a 3 semanas, e a D3 não inferior a 4 meses. Salvo Pacientes imunossuprimidos que o intervalo é de 28 dias.

7.3 Viajantes que não completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina contracovid-19, poderão antecipar a segunda dose respeitando o intervalo mínimo de 21 dias para a vacina da Pfizer/Wyeth e 28 dias para a vacina AstraZeneca/Fiocruz (esquema homólogo);

7.4 Viajantes que completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina Sinovac/Butantan e terão como destino países cujos órgãos regulatórios não incluíram este imunizante até o momento na sua lista de vacinas autorizadas, poderão receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino (esquema heterólogo) seguindo o racional de intercambialidade de vacinas publicado na Nota Técnica nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Neste caso, o intervalo mínimo entre a série primária de vacinação e a terceira dose do outro imunizante será de 28 dias.

8. TERCEIRA DOSE – OU DOSE DE REFORÇO.

8.1 Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 1, e INFORME TÉCNICO nº 19/2021 DVE/CEVS/SES-RS2 e a NOTA TÉCNICA Nº 65/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 3; a nota técnica 19/2021 DVE/CEVS/SES-RS4 o município de Sapucaia do Sul, adota o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Reforçamos que este processo vacinal, tem características diferentes de outras campanhas. As diretrizes são dinâmicas e podem ser alteradas, sempre obedecendo o que determina o PNI, PNO e as normas do Governo Estadual.

¹ <https://drive.google.com/file/d/1GZla607tiQByN0us7405rFeoBzyuA1Lk/view?usp=sharing>

² <https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=657104>

³ <https://cdn.oantonista.com/uploads/2021/12/Nota-Tecnica-65-Antecipacao-da-Dose-de-Reforco.pdf>

⁴ <https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202112/29170230-nota-tecnica-19-atualizacao-29-12.pdf>





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

9. RESUMO:

9.1 INTERCAMBIALIDADE: Ficou definido que poderá haver intercambialidade entre os imunizantes administrados. Observando que **PREFERENCIALMENTE** a D2 seja do mesmo laboratório que o usuário recebeu a D1, mas que pode ser de laboratório diferente, levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante. A Terceira dose deve **PREFERENCIALMENTE** ser de laboratório diferente de D1 e D2.

9.2 EXEMPLOS:

9.2.1 Fiz D1 e D2 de CoronaVac, quanto tempo devo esperar para fazer a D3? E qual imunizante mais indicado. *Neste caso, após 4 meses as pessoas com mais de 18 anos podem receber uma dose de reforço, preferencial de ASTRA ou PFIZER.*

9.2.2 Fiz D1 e D2 de Pfizer, qual o intervalo para terceira dose e qual o imunizante mais indicado? *Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de reforço, preferencialmente CoronaVac ou AstraZeneca.*

9.2.3 Fiz D1 e D2 de AstraZeneca, qual o intervalo para terceira dose e qual o imunizante mais indicado? *Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de reforço, preferencialmente CoronaVac ou AstraZeneca.*

9.2.4 Posso fazer a D1 de um imunizante e a D2 de outro? *Apesar de não haver proibição técnica, está indicado que a D1 e D2 sejam Preferencialmente, do mesmo imunizante.*

PFIZER: Intervalo de 7 semanas da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

ASTRAZENECA: Intervalo de da D1 para D2 = intervalo de 7 semanas; de D2 para D3 = 4 meses;

JANSSEN: Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

CORONAVAC: Intervalo de 14 a 28 dias da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

Comissão Municipal de imunização covid19





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Enf ^a . Milena Weide Coordenadora da Vigilância em Saúde	Enf ^o . Laércio Kerber Assessor Superior
Enfa. Flavia Motta Coordenadora Planejamento Saúde	Dra. Daniela Heuser Secretária Municipal da Saúde





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

1.1 24/01/2022 – Segunda-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC	UBS Nova Sapucaia ESF Freitas ESF Primor	Agendamento pelo site
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Natal	Agendamento pelo site
PFIZER - ADULTO	UBS Greiss ESF Fortuna ESF Terra Nova ESF Alcina ESF Colina Verde ESF Capão da Cruz ESF Oswaldo Cruz ESF Bela Vista ESF Cohab Casas ESF Silva ESF João de Barro	Agendamento pelo site
PFIZER - Pediátrica	UBS Centro	Agendamento pelo site
JANSSEN	ESF Vargas	Agendamento pelo site

