



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Sapucaia do Sul, 03 de dezembro de 2021

NOTA TÉCNICA E AGENDA – SEMANA 06 A 10 DEZEMBRO DE 2021

1. TERCEIRA DOSE – OU DOSE DE REFORÇO.

1.1 Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 1, a partir desta data, todas pessoas com mais de 18 anos e que já tenham cumprido 5 meses de intervalo da segunda dose podem agendar uma dose de reforço, que será preferencialmente com o imunizante da PFIZER e alternativamente com imunizante da ASTRAZENECA e JANSSEN. Independente do esquema que o usuário tenha feito.

1.2 Para receber a dose de reforço é obrigatório que a segunda dose tenha sido aplicada até o dia 10 de julho, independente da vacina recebida.

2. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES:

2.1 Uma dose de reforço (com vacina da PFIZER) para pessoas com alto grau de imunossupressão. Para estes o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico. Devem agendar a vacinação pelo WhatsApp: 51-992666063 apenas mensagem de texto.

2.2 Imunodeficiência primária grave.

2.3• Quimioterapia para câncer.

2.4• Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas

2.5(TCTH)em uso de drogas imunossupressoras.

2.6• Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

2.7• Uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por ≥ 14 dias.

2.8• Pacientes em hemodiálise.

2.9• Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

2.10 Uso de drogas modificadoras da resposta imune:

2.10.1 Metotrexato;

2.10.2 Leflunomida

2.10.3 Micofenolato de mofetila

2.10.4 Azatioprina

3. TRABALHADORES DA SAÚDE

A administração de 1 (uma) dose de reforço da vacina para todos os trabalhadores da saúde, que deverá ser administrada 5 meses após a última

¹ <https://drive.google.com/file/d/1GZla607tiQByN0us7405rFeoBzyuA1Lk/view?usp=sharing>





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

dose do esquema vacinal primário (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado. Data de corte: D2 = 10/jul.

3.1.1 Consideram-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose de reforço os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatorios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como por exemplo recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de serviços de interesse à saúde.

4. Adolescentes:

4.1 Nesta semana continuaremos o agendamento e aplicação da vacina para os adolescentes com idade a partir de 12 anos sem comorbidades. Com o imunizante da PFIZER.

5. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE:

5.1 PFIZER:

5.1.1 O intervalo entre a primeira dose (d1) e a segunda dose (d2) passa a ser de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer até o dia 23/out

5.1.2 **XEPA:** D2 intervalo 21 dias de D1.

5.2 ASTRAZENECA/FIOCRUZ (EM FALTA):

5.2.1 Considerando que o imunizante ASTRAZENECA/FIOCRUZ continua em falta. Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, até o dia 23/10/2021, poderão ser imunizados com o imunizante da PFIZER. Que será registrada como D2, sendo considerado esquema vacinal completo. Como determinado por nota Técnica Estadual.

5.3 CORONAVAC/Butantã:

5.3.1 O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 16/nov.

6. VIAGENS INTERNACIONAIS/ CIRURGIAS AGENDADAS

6.1 Pessoas que tenham viagem internacional marcada, ou algum procedimento cirúrgico e que precisem antecipar calendário de imunização, devem





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

procurar o setor de imunizações da Secretaria Mun. Da Saúde, Rua São Cristóvão, 34, munidos de documentos e comprovantes, para que seja realizado a imunização, conforme necessidade comprovada.

6.1.1 Os pacientes com cirurgia agendada, poderão ter a D2 antecipada, desde que o intervalo não seja inferior a 3 semanas, e a D3 não inferior a 5 meses. Salvo Pacientes imunossuprimidos que o intervalo é de 28 dias.

6.2 Viajantes que não completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina contracovid-19, poderão antecipar a segunda dose respeitando o intervalo mínimo de 21 dias para a vacina da Pfizer/Wyeth e 28 dias para a vacina AstraZeneca/Fiocruz (esquema homólogo);

6.3 Viajantes que completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina Sinovac/Butantan e terão como destino países cujos órgãos regulatórios não incluíram este imunizante até o momento na sua lista de vacinas autorizadas, poderão receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino (esquema heterólogo) seguindo o racional de intercambialidade de vacinas publicado na Nota Técnica nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Neste caso, o intervalo mínimo entre a série primária de vacinação e a terceira dose do outro imunizante será de 28 dias.

7. Imunizante JANSSEN

7.1 Usuários que receberam a vacina da JANSSEN, irão receber segunda dose de JANSSEN (que ainda não foi recebido no município) com intervalo de 2 meses entre a primeira e segunda dose; e passados 5 meses, receberão terceira dose (reforço) de qualquer imunizante.

