



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Sapucaia do Sul, 30 de dezembro de 2021

NOTA TÉCNICA E AGENDA – SEMANA 03 A 07 JANEIRO DE 2022

TERCEIRA DOSE – OU DOSE DE REFORÇO.

Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 1, e INFORME TÉCNICO nº 19/2021 DVE/CEVS/SES-RS² e a NOTA TÉCNICA Nº 65/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS³; a nota técnica 19/2021 DVE/CEVS/SES-RS⁴ a partir desta data o município de Sapucaia do Sul, adotará o modelo abaixo descrito. Reforçando que este processo vacinal, tem uma dinâmica diferente de outras campanhas. As diretrizes são dinâmicas e podem ser alteradas, sempre obedecendo o que determina o PNI, PNO e as normas do Governo Estadual.

1. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES:

1.1 Pessoas com alto grau de imunossupressão. Para estes, o intervalo para a segunda e terceira dose, continua com intervalo de 28 dias.

1.2 Somente este grupo, deve receber a quarta dose, com intervalo de 4 meses entre terceira e quarta dose, imunizante PFIZER. A vacina deve ser agendada pelo site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaidosul e o usuário deve optar pelo imunizante da PFIZER.

1.3 Crítérios que definem o quadro de imunossupressão grave:

1.3.1 Imunodeficiência primária grave.

1.3.2 Quimioterapia para câncer.

1.3.3 Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas

1.3.4 (TCTH)em uso de drogas imunossupressoras.

1.3.5 Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm³.

1.3.6 Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por ≥14 dias.

1.3.7 Pacientes em hemodiálise.

1.3.8 Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

1.3.9 Uso de drogas modificadoras da resposta imune:

1.3.9.1 Metotrexato;

¹ <https://drive.google.com/file/d/1GZia607tiQByN0us7405rFeoBzyuA1Lk/view?usp=sharing>

² <https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=657104>

³ <https://cdn.oantonista.com/uploads/2021/12/Nota-Tecnica-65-Antecipacao-da-Dose-de-Reforco.pdf>

⁴ <https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202112/29170230-nota-tecnica-19-atualizacao-29-12.pdf>





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

- 1.3.9.2 Leflunomida
- 1.3.9.3 Micofenolato de mofetila
- 1.3.9.4 Azatiprina

2. TRABALHADORES DA SAÚDE

2.1 Consideram-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose de reforço os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como por exemplo recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de serviços de interesse à saúde.

3. Adolescentes:

3.1 Adolescentes com idade a partir de 12 anos sem comorbidades. Com o imunizante da PFIZER. Intervalo de 7 semanas entre D1 e D2. Esta população ainda não recebe 3ª dose.

4. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE:

4.1 PFIZER:

4.1.1 O intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) continua sendo de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer até o dia 20/nov.

4.2 ASTRAZENECA/FIOCRUZ :

4.2.1 Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, 7 semanas entre D1 e D2, Imunizaremos com D2 quem fez a D1 até até o dia 20/11/2021;

4.3 CORONAVAC/Butantã:

4.3.1 O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 20/dez.

4.4 JANSSEN:

4.4.1 Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

5. VIAGENS INTERNACIONAIS/ CIRURGIAS AGENDADAS





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

5.1 Pessoas que tenham viagem internacional marcada, ou algum procedimento cirúrgico e que precisem antecipar calendário de imunização, devem procurar o setor de imunizações da Secretaria Mun. Da Saúde, Rua São Cristóvão, 34, munidos de documentos e comprovantes, para que seja realizado a imunização, conforme necessidade comprovada.

5.2 Os pacientes com cirurgia agendada, poderão ter a D2 antecipada, desde que o intervalo não seja inferior a 3 semanas, e a D3 não inferior a 4 meses. Salvo Pacientes imunossuprimidos que o intervalo é de 28 dias.

5.3 Viajantes que não completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina contracovid-19, poderão antecipar a segunda dose respeitando o intervalo mínimo de 21 dias para a vacina da Pfizer/Wyeth e 28 dias para a vacina AstraZeneca/Fiocruz (esquema homólogo);

5.4 Viajantes que completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina Sinovac/Butantan e terão como destino países cujos órgãos regulatórios não incluíram este imunizante até o momento na sua lista de vacinas autorizadas, poderão receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino (esquema heterólogo) seguindo o racional de intercambialidade de vacinas publicado na Nota Técnica nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Neste caso, o intervalo mínimo entre a série primária de vacinação e a terceira dose do outro imunizante será de 28 dias.

6. RESUMO:

6.1 **INTERCAMBIALIDADE:** Ficou definido que poderá haver intercambialidade entre os imunizantes administrados. Observando que **PREFERENCIALMENTE** a D2 seja do mesmo laboratório que o usuário recebeu a D1, mas que pode ser de laboratório diferente, levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante. A Terceira dose deve **PREFERENCIALMENTE** ser de laboratório diferente de D1 e D2.

PFIZER: Intervalo de 7 semanas da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

ASTRAZENECA: Intervalo de da D1 para D2 = intervalo de 7 semanas; de D2 para D3 = 4 meses;

JANSSEN: Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

CORONAVAC: Intervalo de 14 a 28 dias da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

IMUNOSSUPRIMIDOS: 28 DIAS de intervalo da D1 para D2; 28 dias da D2 para D3 e 4 meses de intervalo da D3 para D4; independente do imunizante utilizado. Agendamento por mensagem de texto para o **WhatsApp: 51992666063**

